

Памятка для пациента о проведении вакцинации против COVID-19 вакциной «Гам-Ковид-Вак»

1. Противопоказания для вакцинации:
 - возраст до 18 лет и старше 60 лет;
 - гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
 - тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
 - острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры;
 - беременность и период грудного вскармливания;
 - гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты.

2. Перед проведением вакцинации обязательно проводится осмотр врача с измерением температуры тела, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, осмотром зева на основании которых врач определяет отсутствие или наличие противопоказаний к вакцинации.

Врач расскажет Вам о возможных реакциях на вакцинацию и поможет заполнить информированное добровольное согласие на проведение вакцинации.

3. Вакцинация проводится в два этапа с интервалом между прививками 21 день.

4. После проведения вакцинации первые-вторые сутки могут развиваться кратковременные общие (непродолжительный гриппоподобный синдром, повышение температуры тела, артралгия, астения, общее недомогание, головная боль) и местные (болезненность в месте инъекции, гиперемия, отечность) реакции, которые разрешаются в течение трех дней). Реже отмечаются тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда увеличение региональных узлов. Возможно развитие аллергических реакций.

5. Рекомендуются в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сану, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок.

6. Вакцинация против COVID-19 не отменяет для привитого необходимость носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.